

# Instrukcja użycia SoColor Pre-Bonded



## ZALECENIA UŻYCIA: PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

**TEN PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. KONIECZNIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OSTRZEGAWCZY TEST NA ALERGIĘ 48 GODZIN PRZED KAŻDYM UŻYCIEM TEGO PRODUKTU. ALERGIE MOGĄ SIĘ ROZWINĄĆ W SPOSÓB NIESPODZIEWANY, NAWET JEŚLI U TWOJEGO KLIENTA WCZEŚNIEJ ZASTOSOWANO FARBY DO WŁOSÓW TEJ LUB INNEJ MARKI.**

**WAŻNE: BARWNIKI DO WŁOSÓW MOGĄ WYWOŁYWAĆ SILNE REAKCJE ALERGICZNE. ABY POMÓC ZMNIJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA REAKCJI ALERGICZNEJ, DLA FRYZJERA I JEGO KLIENTA PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ JEST ABSOLUTNIE KONIECZNE:**

- **STOSOWAĆ RĘKAWICE OCHRONNE** jednorazowego użytku podczas przygotowania, nakładania i spłukiwania produktu.
- Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko alergii.
- **Nie farbować włosów, jeśli:**
  - na twarzy Twojego klienta występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona;
  - kiedykolwiek u Twojego klienta wystąpiła reakcja na farbowanie włosów;
  - w przeszłości u Twojego klienta wystąpiły reakcje na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

### PRZEPROWADZANIE OSTRZEGAWCZEGO TESTU NA ALERGIĘ:

• Zdejmij kolczyki. Za pomocą wacika nałóż za uchem odpowiednią ilość produktu koloryzującego, nie zmieszanego z oksydantem, na powierzchni wielkości małej monety (od 1 do 2 cm<sup>2</sup>). Powtórz czynność pozwalając, aby preparat wysychł między aplikacjami. Dokładnie zakręć pojemnik z produktem koloryzującym. Odczekaj 48h nie myjąc, nie zakrywając i nie dotykając tej części skóry. Jeśli w tym czasie Ty albo Twój klient zauważycie nieprawidłową reakcję, taką jak: swędzenie, zaczerwienienie lub opuchnięcie tego miejsca lub jego okolic, **NIE NAKŁADAĆ PRODUKTU.**

### **SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

• W PRZYPADKU REAKCJI ALERGICZNEJ PODCZAS UŻYCIA, takiej jak: intensywne swędzenie, podrażnienie, wypryski lub pieczenie skóry głowy, natychmiast spłukać mieszankę i zaprzestać użycia produktu. W przypadku trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed ponownym użyciem farby do włosów, Twój klient powinien skontaktować się z lekarzem. Poinformuj swojego klienta, że **JEŚLI W KOLEJNYCH DNIACH PO APLIKACJI** pojawia się: swędzenie, zaczerwienienia lub wypryski na skórze głowy lub ciała, obrzęk oczu i/lub twarzy, pęcherze lub wysięk na skórze głowy lub ciała, należy skontaktować się z lekarzem.

### **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.**

- Stosować wyłącznie z rekomendowanymi oksydantami o maksymalnym stężeniu 12% (40 vol). Nie stosować z nadtlenkiem wodoru o stężeniu wyższym niż 40 vol (12%).
  - Kolekcję Gotową i Refleksów SoColor stosować z oksydantem o maksymalnym stężeniu nadtlenu wodoru 40 vol (12%) w proporcji 1:1.
  - Kolekcję Extra Coverage SoColor stosować z oksydantem o stężeniu nadtlenu wodoru 20 vol (6%) w proporcji 1:1
  - Kolekcję Blonde SoColor stosować z oksydantem o stężeniu nadtlenu wodoru 30 vol (9%) lub 40 vol (12%) w proporcji 1:2.
- Ścisłe przestrzegać podanych proporcji.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie stosować do barwienia brody, wąsów lub innych celów niż farbowanie włosów. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.
- W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć, a następnie przemyć oczy dużą ilością wody.
- Dobrze spłukać włosy po użyciu.
- Zaleca się przygotowania i nakładanie mieszanki w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
- Nie wdychać, nie połykać.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących indywidualnej wrażliwości skóry Twojego klienta, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Odczekać 15 dni po zabiegu trwałej ondulacji lub trwałego wygładzania włosów (zastosowanie technologii tiolowej lub cysteinowej) przed aplikacją farby do włosów.
- Nie używać, jeśli włosy były wcześniej farbowane henną lub koloryzacją progresywną.

**PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI UŻYCIA. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.**

### **PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE:**

- Używać tylko z zalecanymi oksydantami (patrz wyżej).
- Stosować rękawice ochronne jednorazowego użytku.
- Ścisłe przestrzegać podanych proporcji.
- Ścisłe przestrzegać sporządzania mieszanki w shakerze. Należy go otworzyć natychmiast po zakończeniu mieszania, aby zapobiec rozerwaniu shakera i niepożądanemu wytrąsnięciu produktu.

### **NAKŁADANIE I SPŁUKIWANIE:**

- Stosować rękawice ochronne jednorazowego użytku.
- Nie stosować metalowych przedmiotów (wsuwki, klipsów, grzebienia...).
- Standardowy czas trzymania: kolekcja SoColor Gotowa i Refleksów 35-45 minut, kolekcja SoColor Extra Coverage 45 minut i kolekcja SoColor Blonde 50 minut, w pokojowej temperaturze.
- Po upływie czasu działania starannie spłukać włosy.

